

INGESTA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS CAUSTICOS



Los niños menores de 5 años tienen mayor riesgo de ingerir sustancias causticas de forma accidental

CUIDADO

- No reenvases sustancias cáusticas en botellas de bebidas de consumo común.
- Mantén las sustancias cáusticas de uso domiciliario fuera del alcance de los niños



PELIGRO ACIDOS - ALCALIS

Son sustancias ácidas con un pH menor de 4 o alcalinas con un pH mayor de 12, generan daño al tracto digestivo y respiratorio.

Después de su consumo, pueden producir:

vómito, dificultades para comer o beber, dolor en el pecho o en el abdomen, babeo en los bebés, quemaduras en la cavidad oral

Complicación: pueden producir perforación del esófago o cicatrización con estrechez del esófago que impide la alimentación.

¿QUÉ DEBO HACER SI MI HIJO BEBE UN CAUSTICO?



Camino al hospital: no debe inducir vómito, no debe ofrecer alimentos ni bebidas, ni siquiera agua.

**CONSULTE INMEDIATAMENTE AL SERVICIO DE
URGENCIAS**

**PADRES O CUIDADORES TRATEN DE MANTENER LA CALMA Y SIGAN
NUESTRAS RECOMENDACIONES.**